

15 脳梗塞のICD10別患者数

指標の解説

- 脳梗塞は、早期に治療を行うことが効果的とされており、その多くが救急搬送されるため、受け入れには早期治療及び救急体制の確保が必要となる。
- 発症から3日以内の患者を多く受け入れ、かつ、平均在院日数が短い場合は、救急に積極的で質の高い医療を提供していると評価できる。

ICD-10	傷病名	発症日から	症例数(件)	平均在院日数(日)	平均年齢(歳)	転院率(%)
G45\$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	3日以内	7	5.7	75.0	0
		その他	2	4.5	72.5	0
G46\$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	3日以内	0	-	-	-
		その他	0	-	-	-
I63\$	脳梗塞	3日以内	151	22.9	74.9	39.7
		その他	19	18.9	68.1	31.6
I65\$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	2	26.5	71.5	0
I66\$	脳動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	1	58.0	88.0	0
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	3日以内	1	29.0	35.0	0
I679	脳血管疾患、詳細不明	3日以内	0	-	-	-
		その他	0	-	-	-